

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                   | 標準値     | 上限値   | 設定量 | 単位    |
|----|------|------------------------|---------|-------|-----|-------|
| 03 | 点滴注射 | ハーセプチン注 (60mg 150mg)   | 6mg/kg  | 600mg | 6   | mg/kg |
| 06 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) | 60mg/m2 | 120mg | 60  | mg/m2 |

| RP | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                                                   | 用量/単位               | Day1  | Day2 | Day3 |  |  |  |  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ソリター-T 3 号 輸液 500mL 「YD」<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1                              | 1袋                  | 09:00 |      |      |  |  |  |  |
| 02 | 点滴注射 | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL<br>ソリター-T 3 号 輸液 500mL 「YD」<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 203ml/h : *点滴時間 2.5時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1        | 8mL<br>1袋           | 11:30 |      |      |  |  |  |  |
| 03 | 点滴注射 | ハーセプチン注 (60mg 150mg)<br>生理食塩液 250mL<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢側管2                          | 0mg<br>1袋           | 11:30 |      |      |  |  |  |  |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢側管1                                                    | 1 B                 | 11:30 |      |      |  |  |  |  |
| 05 | 点滴注射 | ルートキープ用<br>デキサート注射液 6.6mg<br>アロキシ静注 0.75mg/5mL<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢側管1 | 1.5 V<br>1 V<br>1 B | 13:00 |      |      |  |  |  |  |
| 06 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)<br>生理食塩液 500mL                                                                                                                  | 0mg<br>1袋           | 13:30 |      |      |  |  |  |  |

レジメン名称 : 胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                                                                                                                    | 用量/単位     | Day1           | Day2  | Day3  |  |  |  |  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 07 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 850ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢側管2<br>ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」                                                                                                       | 1袋        | 14:00<br>18:00 |       |       |  |  |  |  |
| 08 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>フロセミド注射液 20mg/2mL<br>生理食塩液 100mL                                                                                         | 1A<br>1B  | 15:30          |       |       |  |  |  |  |
| 09 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 102ml/h : *点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢側管1<br>ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」                                                                                                       | 1袋        | 22:00          |       |       |  |  |  |  |
| 10 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 8時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」                                                                                                 | 1袋        |                | 06:00 | 06:00 |  |  |  |  |
| 11 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>硫酸Mg補正液 20mEq/20mL<br>ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」                                                                          | 8mL<br>1袋 |                | 07:30 | 07:30 |  |  |  |  |
| 12 | 点滴注射 | 療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 338ml/h : *点滴時間 1.5時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>デキサート注射液 6.6mg<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:胃 SPH(TS-1 /CDDP/H) イメド` (2回目～<br>点滴注射:<br>点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢側管1 | 1V<br>1B  |                | 07:30 | 07:30 |  |  |  |  |