

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
12	動脈注射	エピルビンシシ注射用50mg	50mg	50mg	50	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL ラクテック輸液 500mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1 A 1袋	06:00						
02	点滴注射	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1袋	08:00						
03	点滴注射	ラクテック輸液 500mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	11:00						
04	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	16:00						
05	点滴注射	セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付) 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1本	夕	朝夕					
06	点滴注射	セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付) 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1本	帰宅時						
07	静脈注射	リドカイン静注2%(100mg/5mL)シリンジ 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・デューシービーズ	1本	1回						

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
08	静脈注射	静脈内注射： アタラックス P 注射液 25mg/1mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 静脈内注射：	1A	1回						
09	静脈注射	IVR室持参 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 静脈内注射：	1本	1回	2回					
10	動脈注射	ディーシービーズ(100-300μm粒) 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 動脈注射：	1V	1回						
11	動脈注射	肝動脈 生理食塩液 20mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 動脈注射：	8mL	1回						
12	動脈注射	肝動脈 エピルビシン注射用50mg 蒸留水（注射用） 20mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 動脈注射：	0mg 2mL	1回						
13	動脈注射	肝動脈 イオメロン 300注 50mL 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 動脈注射：	10mL	1回						
14	点滴注射	肝動脈 ソリター-T 3 号 輸液 500mL 「YD」 療法名:午前・肝動注（50mg）EPI・ディーシービーズ 点滴注射： 点滴速度 50ml/h ： ＊点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋		朝					