

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
06	動脈注射	動注用アイエーコール(50mg 100mg)	50mg	50mg	50	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00						
02	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1V 1袋	10:00						
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
04	点滴注射	ソルデム 3A輸液 1L 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	13:00						
05	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	17:00	13:00	13:00				
06	動脈注射	動注用アイエーコール(50mg 100mg) オムニパーク 350注 20mL 塩化ナトリウム [NaCl] 10% 20mL 療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 動脈注射: 肝動脈	0mg 10mL 2.5mL	1回						
07	静脈注射	リドカイン静注2%(100mg/5mL)シリンジ	1本	1回						

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
08	静脈注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 静脈内注射: アタラックスP注射液 25mg/1mL	1A	1回						
09	静脈注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 静脈内注射: IVR室持参 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL	1本	1回	2回	2回				
10	点滴注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 静脈内注射: 20% マンニトール注射液 300mL	1B	1回						
11	点滴注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 帰室後② セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付)	1本	1回						
12	動脈注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 帰室後① ヘパースフィア (50-100 μ m)	2V	1回						
13	点滴注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 動脈注射: 肝動脈 ヘパースフィア1Vにつき アイエーコールオムニパック混合液5ml添加 ソルデム 3A輸液 1L	1袋		09:00	09:00				
14	点滴注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL	1袋		10:00	10:00				
15	点滴注射	療法名:午後 : 肝動注 アイエーコール・ヘパースフィア 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付)	1本		朝	朝				

レジメン名称：午後：肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア

インターバル日数：28 日

基準日： Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
		療法名:午後：肝動注 アイエーコール・ヘパースファイア 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1			夕	夕				