

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	100mg	100mg	100	mg
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg
05	点滴注射	ピノルビン注 10mg	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
06	点滴注射	オンコビン 1 mg	1. 4mg/m2	2mg	1. 4	mg/m2
07	点滴注射	エト`キサン注 (100mg 500mg)	750mg/m2	1500mg	750	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:R【BS】-THP-COP (R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1 A 1 B	10:00						
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 100mL 療法名:R【BS】-THP-COP (R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 22. 5ml/h : * 点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 90mL	10:30						
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:R【BS】-THP-COP (R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : * 点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 450mL	11:30						
04	点滴注射	グラセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/50mL 療法名:R【BS】-THP-COP (R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	13:00						
05	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL	0mg 1 V	13:30						

レジメン名称 : R【BS】-THP-COP(R : 600mg) (初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	療法名:R【BS】-THP-COP(R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL	0mg 1 B	13:45						
07	点滴注射	療法名:R【BS】-THP-COP(R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 エンドキソン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL	0mg 1袋	14:00						
08	点滴注射	療法名:R【BS】-THP-COP(R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 生理食塩液 50mL 療法名:R【BS】-THP-COP(R : 600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1 B	16:00						